

FEMME ENCEINTE :


VACCINATION ET STRATÉGIE DE COCOONING



LES VACCINATIONS RECOMMANDÉES AVANT LA GROSSESSE

BONJOUR!
JE VOUDRAIS SAVOIR
SI MES VACCINS
SONT À JOUR
POUR UN PROJET
DE GROSSESSE.

BONJOUR! VOYONS CELA ENSEMBLE. VOUS AVEZ BIEN FAIT
DE VENIR ME VOIR. POUR ÉVITER DES RISQUES POUR LA
MÈRE ET POUR LE BÉBÉ, LES VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS,
COMME CEUX CONTRE LA VARICELLE ET LE ROR (ROUGEOLS,
RUBÉOLE ET OREILLONS), DOIVENT ÊTRE FAITS AVANT
LA CONCEPTION. UN DÉLAI DE 2 MDS EST RECOMMANDÉ
ENTRE LA VACCINATION ET LE DÉBUT D'UNE GROSSESSE.



- VACCINS DISPONIBLES CONTRE LA VARICELLE (VARIVAX[®], VARILRIX[®]).
- VACCINS DISPONIBLES CONTRE LA ROUGEOLE, RUBÉOLE ET OREILLONS (PRIORIX[®], M-H-RVAXPRO[®]).

LA COQUELUCHE

DOCTEUR, POURQUOI DEVRAIS-JE ME FAIRE REVACCINER CONTRE LA COQUELUCHE ALORS QUE MA VACCINATION EST À JOUR ?



IL EST RECOMMANDÉ DE SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COQUELUCHE À PARTIR DU 2^e TRIMESTRE DE CHAQUE GROSSESSE, IDÉALEMENT ENTRE 18 ET 34 SEMAINES APRÈS LES DERNIÈRES RÉGLES. MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ VACCINÉE RÉCEMMENT OU LORS D'UNE PRÉCÉDENTE GROSSESSE, UNE NOUVELLE VACCINATION EST NÉCESSAIRE POUR CHAQUE GROSSESSE.

LA COQUELUCHE PEUT ÊTRE GRAVE, VOIRE MORTELLE, POUR LES NOURRISSONS AVANT 3 MOIS. LA VACCINATION DE L'ENFANT DÉBUTE À 2 MOIS DE VIE. EN VOUS VACCINANT DURANT LA GROSSESSE, VOUS TRANSFÉREZ VOS ANTICORPS AU FŒTUS POUR LE PROTÉGER DÈS LA NAISSANCE ET JUSQU'AU DÉBUT DE LA VACCINATION À 2 MOIS.

POUR LES ADULTES :


À NOTER QUE LE VACCIN CONTRE LA COQUELUCHE EST DISPONIBLE UNIQUEMENT SOUS UNE FORME COMBINÉE (REPEVAX[®], BOOSTRIX/TETRA[®]) AVEC LES VACCINS CONTRE LA DIPTÉRIE, LE TÉTANOS ET LA POLIOMYÉLITE.



GRIPPE ET COVID-19

TU AS ENTENDU PARLER DES VACCINS
POUR LA GRIPPE ET LE COVID ?
JE NE SUIS PAS ENCORE
CONVAINCUE...

SALLE
D'ATTENTE



MA GYNÉCOLOGUE M'A EXPLIQUÉ QUE LES
FEMMES ENCEINTES RISQUENT DE PRÉSENTER
DES FORMES GRAVES DE GRIPPE OU DE
COVID-19, AVEC DES COMPLICATIONS
PULMONAIRES ET CARDIAQUES POSSIBLES.
LA FIÈVRE ÉLEVÉE PEUT PROVOQUER DES
CONTRACTIONS, CE QUI AUGMENTE LE RISQUE
DE FAUSSE COUCHE.

LES VACCINS CONTRE LA GRIPPE ET LE COVID-19
SONT SÛRS POUR NOUS ET NOS BÉBÉS.
ILS PEUVENT ÊTRE FAITS EN MÊME TEMPS OU
SÉPARÉMENT, QUEL QUE SOIT LE TRIMESTRE
DE GROSSESSE, SANS DÉLAI SPÉCIFIQUE
ENTRE LES DEUX.

* POUR LA GRIPPE :

POUR LA SAISON 2024-2025, 2 VACCINS ANTIGRIPPAUX
SONT DISPONIBLES EN GUYANE : VAXIGRIP TETRA®
ET INFLUVAC TETRA® (À PARTIR DE 6 MOIS).
CES VACCINS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS INDIFFÉRENNEMENT,
QUELLE QUE SOIT LA CIBLE, SELON LES RECOMMANDATIONS
DE LA HAS.

* POUR LE COVID-19 :

LE DÉLAI À RESPECTER APRÈS LA DERNIÈRE INJECTION
VACCINALE OU LA DERNIÈRE INFECTION COVID-19 EST
DE 6 MOIS MINIMUM, QUELLE QUE SOIT LA SITUATION DE LA
PERSONNE. LE VACCIN MONOVALENT À ARN MESSAGER COMIRNATY
JN1® DE PFIZER/BIONTECH EST DISPONIBLE POUR LA CAMPAGNE 2024-2025



... ET LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS) ?

LA HAS RECOMMANDE QUE LE VACCIN (ABRYSVO®) SOIT ADMINISTRÉ UNIQUEMENT ENTRE 32 ET 36 SEMAINES APRÈS LES DERNIÈRES RÉGLES. ABRYSVO® PEUT ÊTRE ADMINISTRÉ EN MÊME TEMPS QU'UN VACCIN CONTRE LA GRIPPE OU CONTRE LE COVID-19, MAIS UN INTERVALLE MINIMUM DE 2 SEMAINES EST RECOMMANDÉ ENTRE L'ADMINISTRATION DU VACCIN DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE - COQUELUCHE ET L'ADMINISTRATION DE ABRYSVO®.

STRATÉGIE DE COCOONING


LE COCOONING, C'EST LA PROTECTION DES FOETUS ET DES BÉBÉS NON ENCORE VACCINÉS, EN IMMUNISANT TOUS CEUX QUI LES ENTOURENT.

COQUELUCHE :

VACCINATION DES PROCHES DU NOUVEAU-NÉ SI LEUR DERNIER RAPPEL DATE DE PLUS DE 5 ANS, SAUF SI LA MÈRE A ÉTÉ VACCINÉE PENDANT LA GROSSESSE AU MOINS UN MOIS AVANT L'ACCOUCHEMENT.

VARICELLE :

TOUT ADULTE SANS ANTÉCÉDENT DE VARICELLE. VACCINS COMPATIBLES AVEC L'ALLAITEMENT.



GRIPPE :

VACCINATION DE L'ENTOURAGE DES NOURRISSONS DE MOINS DE 6 MOIS A RISQUE DE GRIPPE GRAVE.

ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE (ROR) :

VACCINER LA MÈRE SI SA SÉROLOGIE PRÉNATALE POUR LA RUBÉOLE EST NÉGATIVE OU INCONNUE, IDÉALEMENT JUSTE APRÈS L'ACCOUCHEMENT, MÊME EN CAS D'ALLAITEMENT (SI L'ENFANT N'EST PAS IMMUNODÉFICIENT) VACCINER ÉGALEMENT LE PARENT NÉ APRÈS 1980 ET SANS SCHÉMA VACCINAL COMPLET DE 2 DOSES POUR LA ROUGEOLE, VACCINER TOUTES LES PERSONNES EN CONTACT ÉTROIT ET DURABLE AVEC LE NOURRISSON AU COURS DE SES 6 PREMIERS MOIS