

Dr Dominique ROUSSET
Dr Pierre SALLERIN
Pr Félix DJOSSOU

A Madame la Directrice générale de l'ARS Guyane

Objet : Réponse à votre saisine du 24 mars relative à l'élargissement des tests COVID-19

Madame la Directrice générale,

Par courrier cité en objet, vous sollicitez nos avis sur la priorisation, l'intérêt et la faisabilité d'actions renforcées de dépistage du COVID-19 en vue du contrôle de sa transmission sur notre territoire.

Nous avons opté pour une réponse commune.

Pour ce faire, nous avons organisé :


- une réunion professionnelle le 27 mars avec plusieurs médecins de l'UMIT, Pr DEMAR, Dr ROUSSET, Dr SALLERIN, Pr DJOSSOU (audioconférence entre CHC et IPG). Elle a permis de discuter chacune des mesures proposées et d'évoquer quelques autres (mesures 7 et 8 de notre texte)
- une réunion avec Dr ROUSSET, Dr SALLERIN, Pr DJOSSOU le 28 mars (en présentiel à l'IPG). Elle a été consacrée à la validation des mesures retenues, leurs intérêts, faisabilités et priorisations. Notre avis sur la faisabilité a pris en compte la disponibilité et/ou la capacité à mobiliser les ressources en personnels et de laboratoire (écouvillons, réactifs), ainsi que les diverses contraintes logistiques. La faisabilité et la priorisation sont présentées selon une échelle de 0 (moins favorable) à 5 (très favorable). (Voir le document joint)
- une réunion avec Dr ROUSSET, Dr SALLERIN, Pr DJOSSOU le 29 mars (en présentiel au CHC). Elle a permis la validation et la signature du texte final.

Pour conclure, les mesures pour lesquelles nous sommes le plus favorables sont :

1. Le dépistage des contacts symptomatiques des cas confirmés
2. Le dépistage des personnes symptomatiques à l'aéroport
3. Le dépistage systématique des personnels symptomatiques de santé (institutionnels et libéraux) et des professions exposées (forces de l'ordre, gardiens de prison, ...)
4. Le dépistage des résidents (EHPAD), des détenus et retenus (CRA) symptomatiques
5. Le dépistage de toutes les personnes (pauci)symptomatiques avec signes fortement évocateurs (anosmie, dysgueusie, ...).

Nous vous assurons notre totale disponibilité et collaboration afin de ralentir et retarder la chaîne de transmission de cette infection sur notre territoire.

Fait à Cayenne, le 29 mars 2020



Dr Dominique ROUSSET



Dr Pierre SALLERIN



Pr Félix DJOSSOU

Réponse à la saisine de l'ARS concernant l'opportunité de l'élargissement des indications du dépistage du SARS-CoV2 en Guyane française

Mesure 1

- ✓ *Dépistage des personnes symptomatiques (même paucisymptomatiques) à l'aéroport*

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Evident pour les vols à l'arrivée des zones à risque ○ Acceptable pour tous les vols à l'ère de la pandémie	4	5

Conclusion : OUI

Mesure 2

- ✓ *Dépistage des personnes asymptomatiques à l'aéroport*

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Dépistage de porteurs asymptomatiques ○ Mais <u>rassurance à tort</u> des personnes chez qui l'infection serait en incubation au moment du dépistage	2	1

Conclusion : NON

Alternative : Insister sur les mesures pour l'observance de la quatorzaine

Mesure 3

- ✓ *Dépistage des contacts (pauci)symptomatiques des cas confirmés*

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Evident ○ Mesure déjà en cours	5	5

Conclusion : OUI

Mesure 4

✓ *Dépistage des **contacts asymptomatiques de cas confirmés***

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Dépistage de porteurs asymptomatiques de contacts à risque élevé/modéré ○ Mais <u>rassurance à tord</u> des personnes chez qui l'infection serait en incubation au moment du dépistage	3	2

Conclusion : **NON**

Alternative : Insister sur les mesures pour l'observance de la quatorzaine

Mesure 5

✓ *Dépistage des **soignants asymptomatiques revenant de voyage***

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Dépistage de porteurs asymptomatiques parmi ces soignants ○ Mais <u>rassurance à tord</u> des soignants chez qui l'infection serait en incubation au moment du dépistage	3	2,5

Conclusion : **NON**

Alternative : Insister sur les mesures pour l'observance de la quatorzaine

Mesure 6

- ✓ *Dépistage de toutes les personnes présentant une infection (pauci) symptomatique avec signes fortement évocateurs (anosmie, dysgueusie, ...)*

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Dépistage ciblé en population générale ○ Repérage d'infections autochtones passées inaperçues	3	3

Conclusion : **OUI**

Mesure 7

- ✓ *Dépistage systématique, quelle que soit leur exposition*
- *dessoignants symptomatiques (ES, EMS et libéraux)*
 - *des non-soignants symptomatiques des ES et EMS (EHPAD, HAD, etc.)*
 - *des personnels symptomatiques des laboratoires*
 - *des personnes symptomatiques exerçant certaines professions exposées et/ou de première nécessité: forces de l'ordre, gardiens de prison, préfecture, pompiers, restaurateurs, commerçants toujours ouverts, etc....*

<i>Intérêt de la mesure</i>	<i>Faisabilité (0-5)</i>	<i>Priorisation (0-5)</i>
○ Meilleure sensibilité pour limiter l'incidence et l'impact des infections nosocomiales ou professionnelles	3	4

Conclusion : **OUI**


Mesure 8

- ✓ Dépistage systématique, quelle que soit leur exposition
- **desrésidents symptomatiques des EHPAD**
 - **des détenus et personnels symptomatiques du Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly**
 - **des retenus et personnels symptomatiques du Centre de Rétention Administrative**

Intérêt de la mesure	Faisabilité (0-5)	Priorisation (0-5)
○ Meilleure sensibilité pour limiter l'incidence et l'impact des clusters	3	4

Conclusion : **OUI**

A Cayenne, le 29 mars 2020



Dr Dominique ROUSSET



Dr Pierre SALLERIN



Pr Félix DJOSSOU